

# **PUBLIEKSBIJSLUITER**

## **1. ALGEMENE KENMERKEN**

### **1.1 Benaming**

Furacine Soluble Dressing  
Furacine Oplossing

### **1.2 Samenstelling**

*Furacine Soluble Dressing:*

Werkzaam bestanddeel: nitrofurazone 0.2%. Hulpstoffen: macrogol 300, 1000, 3000.

*Furacine Oplossing:*

Werkzaam bestanddeel: nitrofurazone 0.2%. Hulpstoffen: macrogol 300, 1500 - gezuiverd water.

### **1.3 Farmaceutische vorm en inhoud**

Furacine Soluble Dressing zalf is een gele zalf in tuben van 15 g, 28 g, en 30 g of zakken van 375 g (hospitaal gebruik).

Furacine oplossing is een heldere gele vloeistof in bruine glazen flessen van 200 ml, 250 ml of 500 ml (hospitaal gebruik) en 2 flessen van 250 ml (hospitaal gebruik).

### **1.4 Geneesmiddelengroep**

Furacine Oplossing en Furacine Soluble Dressing (wateroplosbare zalf) zijn middelen tegen besmetting van de huid op basis van nitrofurazone, bestemd voor uitwendig gebruik.

### **1.5 Registratiehouder en fabrikant**

*Registratiehouder:*

Limacom nv  
Kleine Hellekensstraat 53  
3520 Zonhoven

*Fabrikant:*

Sanico N.V./S.A.,  
Industrieterrein 4,  
2300 Turnhout

### **1.6 Registratienummer**

Furacine Soluble Dressing - tube: 616 S 323 F 7

Furacine Soluble Dressing - zak: 616 S 838 F 7

Furacine Oplossing: 616 S 324 F 11

## **2. TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL**

Furacine zalf en Furacine Oplossing worden gebruikt:

- bij besmetting van wonden en verbrandingen met bacteriën
- ter voorkoming van besmetting van wonden en verbrandingen met bacteriën
- bij huidtransplantaties

Furacine Oplossing verdund met steriel water, wordt ook gebruikt als blaasspoeling.

## **3. VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT**

### **3.1 Gevallen waarin het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden**

Als u vroeger een allergie heeft gehad voor Furacine, moet u het niet opnieuw gebruiken.

### **3.2 Nodige voorzorgen bij het gebruik**

Furacine Oplossing kan bij een lage temperatuur troebel worden. Breng in zo'n geval de fles in een warmwaterbad van ongeveer 60 °C totdat de oplossing weer helder is. Bewaar de fles nadien op een wat minder koude plaats.

### **3.3 Wisselwerking met andere geneesmiddelen en voeding**

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

### **3.4 Gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding**

Gebruik Furacine tijdens zwangerschap en borstvoedingsperiode uitsluitend op advies van uw dokter.

### **3.5 Invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen en om machines te gebruiken**

Furacine heeft geen invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen of op het vermogen om machines te gebruiken.

## **4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK**

### **4.1 Posologie**

#### Wonden en verbrandingen

Het doet er niet toe of de zalf of de oplossing is gekozen, beide vormen werken op dezelfde wijze.

*Hoe te gebruiken:*

- Besmette wonden:

Na schoonmaken van de wonde, de Furacine Soluble Dressing direct op de wonde aanbrengen. Ook kan Furacine Soluble Dressing eerst op een gaasverband worden aangebracht dat op de wonde wordt gelegd.

Voor het aanbrengen van Furacine Oplossing een stukje gaas gebruiken. Bij aanbrengen van kompressen, moeten deze vooraf in een proper schaaltje met een weinig Furacine Oplossing overgoten worden; giet nooit overtollige oplossing terug in de fles.

- Brandwonden:

De eerste stap bij elke brandwonde is 15 minuten lang spoelen met koud water om het inbranden te beperken. Daarna Furacine Soluble Dressing of Furacine Oplossing aanbrengen op dezelfde manier als aangegeven voor besmette wonden. Ernstige verbrandingen moeten in een ziekenhuis behandeld worden.

*Hoe dikwijls en hoe lang:*

- Bij besmette wonden wordt meestal tweemaal per dag Furacine aangebracht. Wanneer na 5 tot 7 dagen behandeling nog geen duidelijke verbetering is opgetreden, moet u een dokter raadplegen.

- Bij verbrandingen niet meer dan éénmaal per dag aanbrengen. De dokter beslist echter hoe vaak het verband verwisseld moet worden.

#### Blaasspoeling

Alleen verdunde Furacine Oplossing mag worden gebruikt. Volg stipt de aanwijzingen van uw dokter.

### **4.2 Wijze van gebruik**

Voor uitwendig gebruik.

### **4.3 Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven**

Furacine is bestemd voor uitwendig gebruik. Mocht Furacine langs de mond zijn ingenomen, dan kan misselijkheid, braken en hoofdpijn ontstaan. Waarschuw direct een dokter. Deze kan overwegen de patiënt te doen braken of een maagspoeling uit te voeren.

## **5. BIJWERKINGEN**

Ongeveer 1 persoon op 100 verdraagt Furacine niet goed. De huid wordt dan rood, prikt en jeukt op de plaats waar het product is aangebracht. Als u deze tekenen zou vertonen, stop dan direct met de toepassing van Furacine en neem contact op met uw dokter.

## **6. AANWIJZING VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

### **6.1 Bewaring**

Furacine Soluble Dressing en Furacine Oplossing bij kamertemperatuur bewaren (15-25°C). Als Furacine Oplossing te koud wordt bewaard, kan de oplossing troebel worden. In dit geval de fles in een warmwaterbad van ongeveer 60 °C brengen totdat de oplossing weer helder is.

### **6.2 Houdbaarheid**

Furacine Soluble Dressing mag worden gebruikt tot de datum vermeld op het doosje, etiket en in de vouw van de tube na de letters EX. (eerste dag van de opgegeven maand van het jaar). Furacine Oplossing mag worden gebruikt tot de datum vermeld op het doosje en etiket na de letters EX. (eerste dag van de opgegeven maand van het jaar).

## **7. WIJZE VAN AFLEVERING**

Vrij verkrijgbaar in de apotheek.

## **8. DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DE BIJSLUITER**

maart 2008