

WONDBEHANDELINGSPROTOCOL: KEUZETABEL WONDBEDEKKERS

kleur van de wond:	ZWART	GEEL	ROOD
doel van de behandeling:	necrose chirurgisch verwijderen met pincet en mes of schaar (necrotectomie)	geel materiaal (debris) verwijderen met mes, curette, of mechanisch debridement	beschermen en stimuleren van de groei van granulatieweefsel en nieuwe huid
NATTE WONDEN vocht-absorberende wondbehandeling	1. gazen gedrenkt in antiseptische opl. 1 2. uitgeknepen NaCl 0.9% gazen 3 dd 2 3. alginaat 3,4 4. absorberend zilververband 1,3,4,6 ?	1. alginaat 3,4 of hydrofiber 3,4 2. uitgeknepen 0.9% NaCl gazen 3 dd 2 3. schuimverband 3 Bij tekenen van infectie: 1. gazen gedrenkt in antiseptische opl. 2. absorberend zilververband 3,4,6 ?	1. gaaskompres 3,4 2. hydrofiber 3,4 3. schuimverband 3 Bij tekenen van infectie: 1. gazen gedrenkt in antiseptische opl. 2. absorberend zilververband 3,4,6 ?
VOCHTIGE WONDEN vocht-regulerende wondbehandeling	1. gazen gedrenkt in antiseptische opl. 1 2. uitgeknepen NaCl 0.9% gazen 3 dd 2 3. alginaat 5 4. hydrogel 5 5. hydrocolloid (dikke soort) 3,7 6. zilververband 1,3,5 ?	1. uitgeknepen 0.9% NaCl gazen 3 dd 2 2. hydrofiber 5 of alginaat 5 4. hydrogel 5 5. schuimverband 3 6. hydrocolloid (dikke soort) 3,7 Bij tekenen van infectie: 1. antiseptische producten (zie onder) 2. zilververband 3,5 ?	1. schuimverband 3 2. hydrofiber 5 3. uitgeknepen 0.9% NaCl gazen 3 dd 2 4. hydrocolloid (dikke soort) 3,7 5. vetgaas 5 6. siliconensheet 5 ?
DROGE WONDEN vocht-inbrengende wondbehandeling	NB: droge zwarte necrose zonder infectie kan blijven zitten (droog verbinden). Bij tekenen van infectie necrose verwijderen. Daarna de wond verbinden met een product dat past bij het aspect van de wond na de necrotectomie. ?	1. hydrogel 5 2. hydrocolloid 7 3. uitgeknepen 0.9% NaCl gazen 3 dd 2 Bij tekenen van infectie: 1. gazen gedrenkt in antiseptische opl. 2. antiseptische zalfgazen en zalven ?	1. hydrogel 5 2. hydrocolloid 7 3. siliconensheet 5 4. vetgaas 5 ?

Opmerkingen:

- 1 Vooral bij geïnfecteerde wonden. Bij stinkende wonden kan ook een geur-neutraliserend verband worden gebruikt.
- 2 NaCl gazen 2-3 dd zijn effectief (werkt als mechanisch debridement) maar ook arbeidsintensief, ga na of moderne middelen ook kunnen
- 3 Bij veel exsudaat verband kiezen met voldoende absorptiecapaciteit en/of frequent verwisselen
- 4 Combineren met een extra absorberend secundair verband
- 5 Combineren met een secundair verband
- 6 NB: bij veel exsudaat spoelt het zilver snel uit het verband
- 7 Occlusieveverbanden alleen toepassen bij oppervlakkige wonden zonder ondermijnde wondranden

Voor veel wondbedekkers geldt helaas dat er weinig tot geen evidence is over de werkzaamheid.

De volgorde van de producten in deze tabel berust dan ook vooral op klinische ervaring met de betreffende producten.

De tabel is primair bedoeld voor de behandeling van chronische wonden zoals ulcus cruris, decubitus, arteriële ulcera, e.a. ulcera.

Chirurgische wonden (operatiewonden) worden over het algemeen niet met speciale wondbedekkers bedekt maar met een gaasverband.